



**MIX II e III**



**FERTIPRADO**

O GADO MERECE, A TERRA AGRADECE



# Prados Tempo- rários

**FERTIPRADO**

HERDADE DOS ESQUERDOS

7450-250 VAIAMONTE (PORTUGAL)

TEL. (+351) 245569000 · FAX (+351) 245569103

E-MAIL: FERTIPRADO@FERTIPRADO.COM

**WWW.FERTIPRADO.COM**

# MIX II e III

MISTURA DE SEMENTES BIODIVERSA PARA PRADOS  
TEMPORÁRIOS MULTI-CORTE  
(PASTOREIO E/OU FORRAGEM)  
**ALTA PRODUÇÃO  
& QUALIDADE DURANTE TODO O ANO**



## Características

- Concebida exclusivamente para zonas mais frescas e húmidas e bacias leiteiras do Norte da Península Ibérica.
- MIX II - mistura bianual exclusivamente para corte (feno, silagem ou distribuição em verde).
- MIX III - mistura com duração de 3 a 4 anos para utilização mista para corte e/ou pastoreio. Suporta pastoreios intensos.

## Razões para semear

- Elevada produção de erva durante todo o ano.
- Rica em energia, proteína e alta digestibilidade, reduzindo os custos da alimentação à base de concentrados.
- Fixa azoto atmosférico - Redução nos custos de adubação azotada.
- A melhor solução para produção de forragem para corte entre 2 e 4 anos.
- Rápido crescimento inicial.
- Complementaridade da produção nas diferentes estações do ano.
- Alimentação de qualidade durante vários anos.

## Maneio do MIX II e III 1º ano

- O primeiro corte\* (pastoreio ou mecânico) feito 2 a 3 meses após a sementeira, permite melhorar a homogeneidade do prado e fazer o controlo de infestantes, favorecendo a sua composição florística.

## 2º ano e seguintes

- O repouso invernal (ou redução de carga animal), entre meados de Novembro a Fevereiro, aumenta a produção de erva.
- Entre Março e Outubro podem fazer-se cortes com intervalos de 2 a 3 meses para silagem ou feno de alta qualidade. O aumento da frequência de corte ajuda a estimular o prado e a melhorar o controlo de infestantes.



\*Onde o desenvolvimento de vegetação campestre se justifique

Gama MIX II e III	
MIX II	Mistura bianual exclusiva para corte (feno, silagem ou distribuição em verde)
MIX III	Mistura para 3 a 4 anos. Utilização em corte e/ou pastoreio intenso



	PB (%)	DMS (%)	UFL (kg/Ms)	MS (ton)
Produção	15 - 23	60 - 75	0,80 - 1,00	12 - 22

Época de Sementeira	Densid. de Sementeira (Kg/ha)	Preparação do Terreno	Sementeira	Adubação de Fundo (unidades/ha)	Adub. de Cobertura (unidades/ha)
Fevereiro a Abril Setembro a Outubro	30 - 40	Terra bem desfeita e plana. Profundidade aconselhada de 10 cm	Profundidade da semente: 0,5 a 1 cm Comp.: Rolo dentado, grade de bicos ou arrojão	Azoto: 20 a 40 N Fósforo: 40 a 90 P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Potássio: 40 a 90 K <sub>2</sub> O	Azoto: 20 a 40 N Novembro a Fevereiro/ Março/ Junho/ Julho

(Adubação mediante resultados da análise de solo)